BUIR-BLIESHEIMER
Info-Service

Nr. 23 vom 18.06.2025

Wetter kurz und knapp

Sonnig und trocken, ansteigend heiße Temperaturen bis 34°C am Sonntag. Die neue Woche startet, wie die Vorwoche geendet hat. Im 14-Tage Trend sind keine Niederschläge in Sicht.

Zuckerrüben – Vorplanung der Fungizidstrategie

Am 25. 06. startet wieder das Blattkrankheitenmonitoring auf Cercospora-Blattflecken, Rübenrost, Echter Mehltau und Ramularia - Blattflecken. Die Ergebnisse werden bei LIZ-online und ISIP veröffentlicht.

Aktuell sind noch keine Primärinfektionen in der Region gemeldet worden. Trotzdem gilt es jetzt, die Bestände im Blick zu halten. Die Idealbedingungen für Cercosporainfektionen liegen bei Temperaturen von feucht-warmen 25 – 30°C und hohen Luftfeuchten >90%. Die Schadschwelle liegt zu diesem frühen Zeitpunkt bei 5% Befallshäufigkeit (Boniturtermin bis 31.07.). Ratsam ist es immer, neben den Monitoring-Ergebnissen auch eigene Parzellenkontrollen durchzuführen. Bewährt hat sich hierfür die Blattrupf-Methode (Kontrolle von 100 zufällig ausgewählten Blättern).

Vermeiden Sie unbedingt einen zu späten Spritzstart, da die kurative Leistung der zu Verfügung stehenden Produkte begrenzt ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir den Einsatz eines Fungizides für zu früh. Aktuell finden sich in den meisten Fällen nur bakterielle Blattflecken, die nicht mit Fungiziden bekämpft werden können.

Eine reguläre Zulassung haben in diesem Jahr die Produkte **Propulse** und **Panorama** mit dem Azolwirkstoff Prothioconazol (+Fluopyram/Propulse bzw. Metconazol/Panorama) sowie **Amistar Gold** und **Diadem** mit den Wirkstoffen Revysol und Fluxapyroxat im Bereich der Premiumfungizide. Bis dato haben Kupferpräparate keine Notfallzulassung.

Aufgrund der Witterung empfehlen wir zur Vitalisierung jetzt den Einsatz von **2,0 - 3,0 l/ha UP CUS als Blattdüngungsmaßnahme**. Dies kann auch in Kombination mit BB Bor ausgebracht werden, bitte Bor zuerst einfüllen.

UP CUS ist eine Düngerlösung zur Behandlung von Kupfermangel bei den landwirtschaftlichen Hauptkulturpflanzen durch Blattdüngung. Das Kupfer ermöglicht eine normale Funktion des Stoffwechsels der Pflanzen, da es ein Grundbaustein bestimmter Enzyme und ein wichtiges Element bei der Chlorophyllsynthese ist.

Zum regulären Spritzstart, meist zwischen der Gersten- und Weizenernte, empfehlen wir aufgrund der breiten Wirkung:

1,2 l/ha Propulse + 2,0 – 3,0 l/ha UP CUS + 0,15 % Kantor

BUIR-BLIESHEIMER
Info-Service

Nr. 23 vom 18.06.2025

Unsere Empfehlung zur **diesjährigen Cercospora - Fungizidstrategie**:

Bekämpfung von Blattkrankheiten Cercospora,
Ramularia,
Rost, Mehltau

+ Blattdünger

Propulse 1,2 l/ha + **UP CUS** 2,0 - 3,0 l/ha

Diadem 1,0 l/ha + **UP CUS** 2,0 - 3,0 l/ha

Panorama 0,6 l/ha + **UP CUS** 2,0 - 3,0 l/ha

PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebindegrößen	Aufwandmenge l o. kg/ha	Wartezeit Tage	Wirkung gegen				Gewässer-abstände Regel-abstand 90/75/50%
					Cercospora	Ramularia	Mehltau	Rost	
Amistar Gold	Difenconazol 125 Azoxystrobin 125	5 l	**1,0**	**35**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xx**	10* 10* / 10* / 10*
Diadem	Xemium 50 Revysol 100	5 l 10 l	**1,0**	**28**	**[xx(x)]**	**[xxx]**	**[xx]**	**[xxx]**	10*
Domark 10 EC	Tetraconazol 100	5 l	**1,0**	**28**	**x(x)**	**xxx**	**xx**	**[xx]**	10*
Ortiva	Azoxystrobin 250	1 l 5 l 20 l	**1,0**	**35**	**x**	**[xxx]**	**[xx]**	**[xxx]**	10* 10* / 10* / 10*
Panorama	Prothioconazol 250 Metconazol 90	5 l	**0,6**	**28**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xx**	10*
Propulse	Fluopyram 125 Prothioconazol 125	5 l	**1,2**	**42**	**[xx(x)]**	**[xxx]**	**[xx(x)]**	**[xxx]**	10*
Score	Difenoconazol 250	1 l 5 l	**0,4**	**28**	**x(x)**	**xxx**	**[xx]**	**[xx(x)]**	10 10* / 10* / 10*

Konsequente Schosserbekämpfung in der Zuckerrübe

Momentan werden die ersten Schosser in den Rüben sichtbar. Nutzen Sie freie Zeitfenster und entfernen Sie diese **vor der Samenreife**; **besonders wichtig bei Conviso – Beständen**.

(KWS)

Weitere Fragen?

Für eine individuelle Beratung stehen Ihnen unsere Kundenberater gerne zur Verfügung.